



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
y Política Social

Dirección General de Salud

Datos correspondientes a las semanas 33 a 36.
Periodo comprendido entre el 16 de agosto al 12
de septiembre de 1998.

Servicio de Epidemiología
Ronda Levante, 11. 30008 Murcia
Teléfonos: 968 36 20 00 / 968 36 20 39
Fax: 968 20 16 14
Correo electrónico: bolepi@carm.es

(11,6%), los accidentes (8,2%), y las enfermedades del sistema nervioso (6,2%). **De 15 a 64 años**, la mayor contribución la presentan las neoplasias (35,3%), las cardiocirculatorias (21,6%) y los accidentes (17,5%). **Mayores de 64 años**, predomina la mortalidad por enfermedades cardiocirculatorias (43,7%), seguida del cáncer (21,2%), de las enfermedades respiratorias (11,5%), y las causas digestivas (4,9%).

Mortalidad por causas específicas

Las enfermedades cerebrovasculares y las isquémicas del corazón son las dos primeras causas específicas de mortalidad en ambos sexos (tabla 1). La enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en los hombres y la enfermedad cerebrovascular en las mujeres. En tercer lugar se encuentra el cáncer de pulmón en los hombres y la diabetes mellitus en las mujeres. Se sitúa en la cuarta posición la enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (EPOC) en hombres y cáncer de mama en mujeres.

Años potenciales de vida perdidos (APVP)

El indicador años potenciales de vida perdidos expresa una aproximación a la mortalidad prematura, que es en la Región de Murcia de 14,9 años menos por persona residente fallecida. Los hombres representan el 71,4% de la mortalidad precoz y las mujeres el 28,6% restante. Las causas de mortalidad específica que restan más años de vida, son en los hombres, los accidentes de tráfico (10,8% sobre el número total de APVP), el SIDA (7,5%), la enfermedad isquémica del corazón (5,3%), el cáncer de pulmón (4,7%), y los suicidios (3,9%). En las mujeres es el cáncer de mama (3,1%), accidentes de tráfico (2,6%), el SIDA (2,4%), enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (1,8%), suicidio (1,09%).

La tasa de mortalidad por todas las causas de las personas residentes en la Región de Murcia (fallecidos en España) es de 7,8 fallecidos por cada mil habitantes, que corresponden a 8.582 defunciones. La tasa de mortalidad es 8,3 por mil entre los hombres y de 7,3 en las mujeres. En los hombres las principales causas de muerte son las enfermedades cardiocirculatorias (32,8% sobre todas las muertes de su sexo), las enfermedades neoplásicas (28,1%), y las causas respiratorias (11,9%). En las mujeres destacan las enfermedades del aparato circulatorio (45,4%), las neoplasias (18,8%) y las enfermedades respiratorias (7,7%). **Esperanza de vida** al nacer es de 78,50 años en la región. Es mayor en las mujeres (81,85 años) en 6,7 años que en los hombres (75,15 años).

La tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) es de 7,7 fallecidos por mil nacidos vivos. La tasa de la mortalidad neonatal precoz (nacidos vivos fallecidos con menos de 7 días de vida) es de 3,88 por mil, y la tasa del período posneonatal (fallecidos entre los 28 días y menos del 1 año de vida) es de 2,14 por mil nacidos vivos.

Mortalidad proporcional por grupos de edad


De 0 a 14 años, las anomalías congénitas (29,5%) y enfermedades en el periodo perinatal (29,5%) son las principales causas de muerte (gráfico 1), seguidas de las neoplasias

Gráfico 1. Razón de mortalidad estandarizada por causas de muerte y grupo de edad. Región de Murcia, 1998.

RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR. REGIÓN DE MURCIA - 100%

ALTIPLANO. 9% menos que la Región

CARTAGENA. 6,6% más que la Región



Enfermedades	Año	Casos notificados									Casos acumulados					
		Semana 33			Semana 34			Semana 35			Semana 36			Semanas 1 a 36		
		1998	1997	Mediana	1998	1997	Mediana	1998	1997	Mediana	1998	1997	Mediana	1998	1997	Mediana
Gripe	1980	64	153	129	51	135	135	107	195	147	133	325	202	96.332	134.228	66.531
Tuberculosis respiratoria	1980	6	1	1	2	1	3	2	1	3	3	2	3	102	138	146
Otras tuberculosis	1986	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	22	24	24
Legionelosis	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			15	4	
Hepatitis A	1997	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0			69	24	
Hepatitis B	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			13	21	
Otras hepatitis vírica	1997	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0			14	32	
Fiebres tifoidea y paratif.	1980	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	10	12	17
Disenteria	1982	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	3	3
Toxiinfecciones-Alimen.	1983	3	8	8	13	7	14	1	5	4	19	5	7	275	317	317
Varicela	1980	14	47	40	11	60	28	13	37	18	10	12	12	5.779	7.618	7.511
Sarampión	1980	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	33	43
Rubeola	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	17	74	96
Parotiditis	1980	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	108	33	33
Tosferina	1980	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	49	11
Enfermedad meningocóc.	1980	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	64	35
Otras meningitis	1986	0	2	1	1	1	1	1	1	0	3	0	1	36	337	33
Sífilis	1982	0	1	0	1	3	1	1	2	0	0	0	0	21	17	18
Infección gonocócica	1982	0	2	1	0	2	2	0	0	0	1	1	0	12	14	14
Fiebre exantemática me.	1981	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	7
Brucelosis	1980	0	1	1	5	4	1	1	0	1	2	0	0	34	65	65
Sífilis congénita	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0	
Paludismo	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1


Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración
Abanilla	4.988	83,3	Calasparra	8.509	100,0
Abarán	12.229	93,8	Campos del Río	1.815	25,0
Águilas	27.802	100,0	Caravaca de la Cruz	19.475	93,3
Albudeite	1.263	100,0	Cartagena	166.419	97,3
Alcantarilla	35.017	97,2	Cehegín	11.777	96,9
Aledo	896	50,0	Ceuti	7.140	100,0
Alguazas	7.627	100,0	Cieza	31.742	77,6
Alhama de Murcia	14.636	61,1	Fortuna	5.859	100,0
Archena	14.140	70,0	Fuente Álamo de Murcia	7.591	100,0
Beniel	8.525	70,0	Jumilla	19.122	45,8
Blanca	5.363	100,0	Librilla	3.814	100,0
Bullas	9.863	100,0	Lorca	66.249	95,1

Población	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Nordeste		Altiplano		Oriental		TOTAL	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Enfermedades														
Gripe	99	31.733	39	14.032	152	25.052	0	6.318	0	3.440	65	15.757	355	96.332
Tuberculosis respiratoria	4	37	5	43	0	3	0	1	0	1	4	17	13	102
Otras tuberculosis	0	12	2	7	0	1	0	0	0	0	0	2	2	22
Legionelosis	1	8	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	1	15
Hepatitis A	1	30	2	11	0	8	0	5	0	0	0	15	3	69
Hepatitis B	0	5	0	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	13
Otras hepatitis víricas	0	6	1	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	14
Fiebres tifoidea y paratifoidea	1	3	1	4	0	1	0	1	0	1	0	0	2	10
Disenteria	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Toxinfecciones alimentarias	3	104	15	49	3	15	1	54	14	18	0	35	36	275
Varicela	13	2.336	16	1.263	9	654	0	628	1	43	9	855	48	5.779
Sarampión	0	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	8
Rubeola	1	8	0	5	0	3	0	0	0	0	0	1	1	17
Parotiditis	1	80	0	11	0	4	0	3	0	1	1	9	2	108
Tosferina	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	1	7
Enfermedad meningocócica	2	12	0	1	0	7	0	0	0	3	0	2	2	25
Otras meningitis	3	19	1	8	1	5	0	1	0	2	0	1	5	36
Sífilis	0	4	2	16	0	1	0	0	0	0	0	0	2	21
Infección gonocócica	1	3	0	6	0	1	0	1	0	0	0	1	1	12
Fiebre exantemática mediterránea	1	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7
Brucelosis	2	8	4	14	0	4	2	5	0	0	0	3	8	34
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Paludismo	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración
Lorquí	5.414	100,0	Torre Pacheco	18.021	75,0
Mazarrón	16.778	100,0	Torres de Cotillas, Las	16.077	94,4
Molina de Segura	42.053	29,2	Totana	21.557	96,7
Moratalla	7.570	75,0	Ulea	1.006	83,3
Mula	13.028	79,5	Unión, La	12.957	100,0
Murcia	364.571	57,4	Villanueva del Río Segura	1.568	87,5
Ojos	714	87,5	Yecla	28.595	93,8
Pliego	3.180	91,7	Santomera	9.610	100,0
Puerto Lumbreras	10.741	100,0	Alicazares, Los	5.256	87,5
Ricote	1.594	83,3			
San Javier	16.502	100,0	Total Región	1.102.469	79,3
San Pedro del Pinatar	13.816	80,6			

Cardiovasculares...
38,8%

Otras causas
13,1%



Hombres

Causas	Casos	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	521	11,6	96,29
Enfermedades cerebrovasculares	465	10,3	85,94
Cáncer de pulmón	362	8,0	66,90
EPOC y afines	336	7,5	62,10
Cirrosis hepática y otras	134	3,0	24,77
Accidentes de vehículos a motor	132	2,9	24,40
Cáncer de próstata	125	2,8	23,10
Cáncer de intestino grueso	97	2,2	17,93
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	79	1,8	14,60
Diabetes mellitus	75	1,7	13,86
Resto de causas	2.326	51,6	429,9
Total	4.508	100,0	833,17

Mujeres

Causas	Casos	%	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	646	14,3	116,15
Enfermedades isquémicas del corazón	441	9,8	79,29
Diabetes Mellitus	164	3,6	29,49
Cáncer de mama	141	3,1	25,35
EPOC y afines	118	2,6	21,22
Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	96	2,1	17,26
Entidades mal definidas	95	2,1	17,08
Enfermedad hipertensiva	84	1,9	15,10
Enf. del sistema nervioso y de los sentidos	81	1,8	14,56
Cáncer de intestino grueso	76	1,7	13,66
Resto de causas	1.942	43,1	349,17
Total	4.508	100,0	732,50

Áreas de Salud

Al comparar la mortalidad general de las áreas de salud con el conjunto regional, observamos mayor

mortalidad en el área de Cartagena y menor mortalidad en el área del Altiplano (mapa 1). Al hacer la misma comparación de la mortalidad general por sexos, observa-

mos que las diferencias con el promedio regional se concretan en Cartagena en un exceso de mortalidad en los hombres y en el área del Altiplano en menor mortandad en las mujeres.

En el área de salud de Murcia se observan más defunciones por trastornos mentales que en la región. Este exceso de mortalidad se concreta en las muertes por esta patología distintas de las psicosis alcohólicas en el sexo femenino.

Las defunciones por enfermedades neoplásicas y las cardiovasculares están aumentadas, en el **área de salud de Cartagena**. Por causas específicas, en este área destaca la sobremortalidad por enfermedades de la circulación pulmonar, reumáticas y pericárdicas del corazón. Por sexos, se mantiene la mayor mortalidad cardiovascular, junto con un exceso de defunciones en las patologías endocrino-metabólicas-inmunitarias en los hombres. En las mujeres, se manifiesta un mayor número de fallecimientos por enfermedades de la circulación pulmonar, reumáticas y pericárdicas del corazón.

El área de salud de Lorca está aumentado el índice de suicidios, y el de las entidades mal definidas.

El área del Noroeste presenta una menor mortalidad por tumores, enfermedades del sistema nervioso, y endocrino-metabólicas-inmunitarias en el sexo masculino. Entre éstas sobresale por su menor índice, la cirrosis hepática y el cáncer de pulmón.

En el área del Altiplano registra una menor mortalidad general. Son las enfermedades cardiovasculares las únicas que presenta un exceso significativo. Las mujeres obtienen un menor índice que el regional en los tumores y en las causas gineco-urinarias.

En la Vega del Segura - Comarca Oriental se alcanza un exceso en la certificación de causas mal definidas en ambos sexos. Hay una sobrerrepresentación del tumor maligno de intestino grueso en ambos sexos. En los hombres existe un aumento significativo de las enfermedades cerebrovasculares.

Lluís Cirera Suárez

Servicio de Epidemiología

D. G. de Salud

Consejería de Sanidad y Política Social

Suscripción: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGÍA
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad y Política Social
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008 (Correo electrónico: bolepi@carm.es)