

VACUNA PARA PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

La mejor solución

Durante el presente curso escolar, se va a administrar la **vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero** (o vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH) a las niñas nacidas en 2010. Esta vacuna se administra en el centro escolar, en dos dosis, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, aproximadamente. Coincidiendo con la 1ª dosis, se administrará una dosis de la vacuna frente al **Meningococo ACWY**. Si a la hora de la vacunación su hija padeciera alergia, fiebre o enfermedad consulte a su pediatra o al Programa de Vacunaciones. **Recuerde que a los 11 años** debe acudir a su centro de salud para la revisión del Programa de Atención al Niño.

Anote los siguientes datos sobre su hija:

NOMBRE Y APELLIDOS // D.N.I. //
 FECHA DE NACIMIENTO (Importante) // TELÉFONO //
 DOMICILIO //
 POBLACIÓN //
 CÓDIGO POSTAL // CORREO ELECTRÓNICO //
 CENTRO DE SALUD AL QUE PERTENECE / MUTUALIDAD //
CENTRO ESCOLAR (Importante) //

MUY IMPORTANTE. Para proceder a la vacunación es necesaria su autorización. Escriba en la casilla correspondiente SI o NO referente a la vacunación de su hija. En ambos casos es imprescindible su firma. Una vez firmado, mande este impreso al centro escolar con su hija. Gracias.

deseo que vacunen a mi hija frente al VPH FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR.

deseo que vacunen a mi hija frente al Meningococo ACWY

Meningococo ACWY:
 Si ya ha sido vacunada este año 2021 de Meningococo ACWY, por favor anote aquí la fecha //

ESPACIO RESERVADO AL PERSONAL SANITARIO		
Pegar código de barras 1ª DOSIS VPH	Pegar código de barras Meningococo ACWY	Pegar código de barras 2ª DOSIS VPH
Fecha: //	Fecha: //	Fecha: //

No ha sido vacunada de VPH

Por contraindicaciones Por negativa Por ausencia

A su hija

Se le ha administrado la **2ª dosis** de la vacuna frente al **VPH**.

No ha sido vacunada de VPH

Debe ponerse en contacto con su Centro de Salud Fecha de administración: // de // de 2022

Guarde esta pestaña junto al carnet de vacunaciones

A su hija

Se le ha administrado la **1ª dosis** de la vacuna frente al **VPH**. (Se le administrará la 2ª en el plazo de 6 meses aprox.)

Se le ha administrado la vacuna frente al **Meningococo ACWY**

Debe ponerse en contacto con su Centro de Salud Fecha de administración: // de // de 2021

Guarde esta pestaña junto al carnet de vacunaciones

Consejería de Salud de la Región de Murcia / Dirección General de Salud Pública y Adicciones / Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Programa de Vacunaciones. / Colabora: Servicio Murciano de Salud y Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia

PARA EL PROGRAMA DE VACUNAS PARA LOS PADRES PARA LOS PADRES

Información sobre las vacunas del Virus del Papiloma humano (VPH) y Meningococo ACWY

¿Qué es el VPH?

Es el virus de transmisión sexual más común en España. Más de la mitad de las mujeres sexualmente activas adquirirán la infección en algún momento de su vida.

La mayoría de las infecciones no presentan síntomas y desaparecen por sí solas, aunque en algunas ocasiones la infección se mantiene y puede causar lesiones precancerosas e incluso cáncer en el cuello del útero.

En Murcia todos los años aparecen aproximadamente 65 casos de cáncer de cuello de útero y fallecen unas 19 mujeres.

¿Por qué es necesario vacunarse frente al VPH?

Si se recibe la vacuna antes del comienzo de las relaciones sexuales protege frente a la gran mayoría de los cánceres del cuello de útero.

¿Quién debería vacunarse?

Deben recibir la vacuna las niñas de 6º de Primaria. La pauta de vacunación es de 2 dosis: la primera dosis a principios de curso y la segunda a los seis meses de la primera.

¿Por qué es necesario vacunarse frente a Meningococo ACWY?

Las enfermedades causadas por el Meningococo ACWY (meningitis, sepsis, etc.) son muy graves e incluso pueden causar la muerte. Estas enfermedades se contagian de una persona a otra. Los periodos de la vida de máxima incidencia son los primeros cinco años de vida y durante la adolescencia.

¿Quien debería vacunarse frente a Meningococo ACWY?

Deben recibir la vacuna los escolares de ambos sexos de 6º de Primaria. Aquellos que hayan recibido una dosis de vacuna frente a Meningococo C con 10 o más años deberán recibir una dosis de la vacuna frente a los serogrupos ACWY siempre que haya transcurrido más de 4 semanas desde la vacuna frente al serogrupo C.

¿Cuáles son los riesgos de estas vacunas?

La vacuna frente al VPH se viene aplicando en todo el mundo más de 18 años y casi 400 millones de mujeres ya la han recibido. Desde entonces se ha comprobado que es muy segura.

Cualquiera de las dos vacunas (VPH y Meningococo ACWY) pueden causar reacciones adversas pero que suelen ser leves y que desaparecen en pocas horas. Estas reacciones son:

- Reacciones en el brazo donde se administró la vacuna, como dolor, enrojecimiento e hinchazón.
- Décimas de fiebre en una de cada diez niñas.
- Dolor de cabeza en una de cada tres.
- Mareos debidos a la inyección pero no al contenido de la vacuna.

¿Qué hacer en caso de una reacción?

- Para la hinchazón del brazo se recomienda frío local y antiinflamatorios (ibuprofeno).
- Para las décimas de fiebre: paracetamol o ibuprofeno.
- Para evitar los mareos: permanecer sentada unos 15 minutos después de recibir la vacuna.

Consulte con el médico si estas reacciones aumentan de intensidad o duran más de lo habitual.

¿Dónde puedo tener más información?

En su Centro de Salud o en los teléfonos del Programa de Vacunaciones: 968 366 811, 968 362 282 y en www.murciasalud.es/vacunaciones